1731

j'ay examiné les trois pieces Anatomiques que mr
Bertin Eleve de la chirurgie à Bicestre a presenté
à l'academie et qui font le sujet de ses observations
dont voici le Rapport.
jl est question dans la premiere d'une fracture de
l'apophise Acromion que mr Bertin trouva sur
un sujet agé de soixante et dix huit ans et dont la
non consolidation suivant luy doit etre imputée au
mélange de l'humeur sinoviale avec le suc osseux qui a
empeché que ce dernier eut assés de consistence pour former
un Cal solide. mr Bertin ~~n'ignore pas que~~ ne doit pas
ignorer que le defaut de consolidation des pieces fracturées
peut provenir de plusieurs causes; car premierement le sujet
dont il se sert pour Etayer son opinion etoit tres agé, et dans
la vieillesse les sucs, sont moins abondans et moins propres
à consolider les os fracturés. secondement les fluides pouvoient
etre alterés par quelque virus inconnu à mr Bertin, 3°
La fracture etoit arrivée à une partie exposée dans le
dernier cas aux mêmes mouvemens que ceux qui se passent
entre la clavicule et l'apophise acromion, quatriemement
enfin les pieces fracturées s'entretouchoient par tres peu de
surface et leurs frottemens reiterés ont donnés lieu à l'espece
d'articulation qui s'est formée dans l'endroit de la fracture

AR C 33
d.3 no
35

Le sujet de la seconde observation de mr. Bertin sont trois petites tumeurs situées dans l'intervalle qu'il y a du cartilage xiphoïde à l'ombilic, dont la plus considerable etoit de la grosseur d'une noisette; ces tumeurs tenoient par de petits pédicules à la ligne blanche, dont cependant les fibres ne luy ont point paru s'ecarter. l'ouverture de ces tumeurs ne luy fit appercevoir qu'une graisse épaissie.
Enfin dans la troisiéme observation il s'agit d'une hernie inguinale rentrée d'elle même et dont les parties qui la formoient etoient enveloppées dans un double sac l'un desquels etoit formé par le tissu cellulaire et l'autre par la vraie lame du péritoine ces deux sacs etoient unis ensemble par un tissu cellulaire. dans le fond je crois que ce n'etoit qu'un seul et même sac devenu tres epais par l'ancienneté de la hernie. mr. Bertin pense qu'un cas semblable pourroit en imposer au chirurgiens dans l'operation du bubonocelle s'il prenoit le pretendu second sac pour l'intestin mais ce ne sera jamais un chirurgien instruit qui donnera dans cette méprise, la couleur de l'intestin et celle du sac etant bien differentes. je ne pense pas au reste que l'Académie puisse ~~faire~~ tirer aucun avantage de ces trois observations.

à Paris le 8. 9bre 1765. Didriy

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE